



مرض فوجت كويانا جي هارادا (VKH)

ما هو ؟

يُعرّف بأنه مرض التهابي مناعي ذاتي يؤثر على مشيمة العين وقد يشمل على أعضاء أخرى مثل الأذن، والجلد، وأغشية السحايا المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي.

يعتبر هذا المرض من أشهر مسببات التهابات الطبقة العنينية في المملكة العربية السعودية لدى الكبار

والأطفال !!

ما هي الأسباب؟

على الرغم من أن السبب مجهول حتى الآن، فإن النظريات العلمية تعتقد أن المسبب لهذا المرض هو استجابة مناعية غير طبيعية على أجسام مضادة متواجدة في الخلايا التي تفرز الميلانين، وذلك يفسر ظهور أعراض المرض على الأعضاء التي تحتوي على خلايا تفرز الميلانين مثل العين و الجلد.

ما هي العوامل التي تزيد فرصة حدوث المرض؟



العمر

- ينتشر غالباً بين 30 - 40 سنة



العامل الوراثي



الجنس

- لا يلعب دوراً !




العرق

- ينشر لدى الآسيويين، واللاتينيين، والأمريكيين

أعراض غير محددة تشبه أعراض الأنفلونزا (مثل الصداع والحمى والدوخة وآلام العين) لمدة 3-5 أيام

عدم وضوح الرؤية الذي يؤثر في البداية على عين واحدة فقط ، ولكنه يتطور إلى العين الثانية في غضون أسبوعين

بقع بيضاء اللون في الوجه (البهاق)، تغير لون الشعر إلى الأبيض، ظهور بقع في العين.



ما هي المضاعفات المحتملة ؟

قد يؤدي إلى فقدان البصر



يزيد من نسبة حدوث مرض الماء الأزرق




يزيد من نسبة حدوث مرض الماء الأبيض





نظف العين
Clean Your Eyes

كيف يتم تشخيص المرض؟



- بشكل مبدي يتم تشخيص المرض عن طريق الفحص السريري، واستخدام منظار فحص العين.
- يمكن اللجوء اختبارات إضافية مثل التصوير المقطعي البصري ، تصوير الأوعية الدموية للعين ، تخطيط كهربية الشبكية) إذا كانت النتائج غير حاسمة أو لتقييم كفاءة العلاج.

كيف يتم علاج المرض؟

- في المرحلة البدائية يتم استخدام الكورتيكوستيرويد بجرعات عالية عن طريق الوريد لمدة 6 اشهر.
- يتم بعد ذلك استخدام الكورتيكوستيرويد عن طريق الفم أو أدوية مثبطات المناعة عن طريق الفم.



يمكن الحفاظ على البصر
عندما يتم تشخيص

الحالة مبكراً !!

